

RİSKLİ ALKOL KULLANIMI VE ALKOL KULLANIM BOZUKLUĐU



ALKOL KULLANIM BOZUKLUĐU NEDİR?

Kiřide "alkol kullanım bozukluđu" olması için 1 yıl içinde ařađıdakilerden en az ikisi bulunmalı:

- İstendiđinden daha fazla veya uzun süreli kullanım.
- Alkolü bırakmak için istek veya sonuç vermeyen çabalar.
- Alkolü elde etmek için gerekli etkinliklere çok zaman ayırmak.
- Alkol kullanımını için çok büyük bir istek duyma veya kendini zorlanmış hissetme.
- Tekrar eden kullanım sonucu işte, okulda, evde sorumlulukları yerine getiremememe
- Toplumsal ve kişiler arası sorunlara rağmen kullanıma devam etme.

ALKOL KULLANIM BOZUKLUĐU NEDİR?

- Kullanımdan dolayı gnlk etkinliklerin aksaması.
- Tehlikeli olabilecek durumlarda kullanmaya devam etme.
- Olumsuz etkilerinin bilinmesine raėmen kullanmayı srdrmek.
- Tolerans gelişim belirtileri olması
 - İstlenen etkinin ortaya çıkması için artan madde gereksinimi.
 - Aynı miktarda maddenin srekli kullanım sonucu etkisinin azalması durumu
- Yoksunluk belirtilerinin gelişmiş olması (bulantı, uykusuzluk, kusma, sinirlilik, bunaltı, huzursuzluk, saldırganlık, ishal, terleme, titreme, kas sızıları, ateş vb.)

3.5

Her yıl 3.5 milyon insan alkole baęlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetmektedir.

3.

Alkol tüm dünyada önlenabilir ölüm ve yaralanmaların üçüncü temel nedenidir.



Alkolden doğan maddi zarar alkolden elde edilen gelirden çok daha fazladır.

200

Riskli alkol kullanımı 200'den fazla hastalık ve yaralanma durumuna neden olur.



Eęitimde başarısızlık, suça eğilim, alkole baęlı saęlık problemleri alkol kullanımıyla doğru orantılı olarak artar.

RİSKLİ ALKOL KULLANIMI NEDİR?

Erkekler için bir seferde 4 ya da daha fazla birim alkol ya da haftalık 14'ten fazla birim alkol kullanılması riskli alkol kullanımıdır.


Kadınlar için bir seferde 3 ya da daha fazla birim alkol ya da haftalık 7'den fazla birim alkol kullanılması riskli alkol kullanımıdır.



BİR BİRİM ALKOL NE KADAR BİLİYOR MUSUN?

1 tek votka, cin, viski
1 tek rakı

1 kadeh şarap
330 ml bira



ALKOLÜN YOL AÇTIĐI SAĐLIK SORUNLARININ FARKINDA MISIN?

Kısa dönemde ortaya çıkan sađlık sorunları:



Motorlu taşıt kazaları, düşmeler bođulmalar ve yanıklar gibi yaralanmalar.

Cinayet, intihar, cinsel saldırı ve yakın partner şiddeti dahil şiddet.



Alkol zehirlenmesi gibi kandaki yüksek alkol seviyelerinden kaynaklanan acil durumlar.

Korunmasız seks veya birden fazla partnerle seks dahil riskli cinsel davranışlar. Bu davranışlar istenmeyen gebelik veya HIV dahil cinsel yolla bulaşan hastalıklara



Hamile kadınlar arasında düşük ve ölü doğum veya Fetal Alkol Sendrom bozuklukları.

ALKOLÜN YOL AÇTIĐI SAĐLIK SORUNLARININ FARKINDA MISIN?

Uzun dönemde ortaya çıkan sađlık sorunları:
Yüksek tansiyon, kalp hastalığı, felç, karaciđer hastalığı ve sindirim sorunları.



Bađışıklık sisteminin zayıflaması, ve artan hastalanma riski.

Meme, ađız, bođaz, yemek borusu, karaciđer ve kolon kanseri.



Demans ve kötü okul performansı dahil öğrenme ve hafıza sorunları.

ALKOLÜN YOL AÇTIĐI SAĐLIK SORUNLARININ FARKINDA MISIN?

Uzun dnemde ortaya ıkan sađlık sorunları:



Üretkenlik kaybı, aile sorunları ve işsizlik gibi sosyal sorunlar.

Depresyon ve anksiyete dahil ruh sağlığı sorunları.



Alkol kullanım bozuklukları veya alkol bađımlılıđı.

YARDIM ALABİLİRSİN!



YEŞİLAY



Bu kuruluşlar gizlilik esasında ücretsiz hizmet vermektedir.